

## Оценка состояния пациента с доброкачественной аденомой простаты по международной шкале симптомов (IPSS)<sup>1</sup>

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Возраст \_\_\_\_\_ Дата заполнения \_\_\_\_\_

Шкала IPSS	0	1	2	3	4	5
	Никогда	Реже, чем 1 раз в неделю	Реже, чем в половине случаев	Примерно в половине случаев	Чаше, чем в половине случаев	Почти всегда
1. Как часто в течение последнего месяца у Вас было <b>ощущение неполного опорожнения</b> мочевого пузыря после мочеиспускания?						
2. Как часто в течение последнего месяца у Вас была <b>потребность мочиться чаще</b> , чем через 2 часа после последнего мочеиспускания?						
3. Как часто в течение последнего месяца у Вас было <b>прерывистое мочеиспускание</b> ?						
4. Как часто в течение последнего месяца Вам было <b>трудно временно воздержаться</b> от мочеиспускания?						
5. Как часто в течение последнего месяца у Вас была <b>слабая струя мочи</b> ?						
6. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось <b>натуживаться</b> , чтобы начать мочеиспускание?						
7. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось <b>вставать ночью</b> , чтобы помочиться?						
<b>Суммарный балл по IPSS</b>						

Как бы Вы отнеслись к тому, если бы Вам пришлось жить с имеющимися у Вас проблемами с мочеиспусканием до конца жизни?	Прекрасно	<b>0</b>	Неудовлетворительно	<b>4</b>
	Хорошо	<b>1</b>	Плохо	<b>5</b>
	Удовлетворительно	<b>2</b>	Очень плохо	<b>6</b>
	Смешанное чувство	<b>3</b>		